

# Порядок применения ЗЦМ "Биолак" и ЗЦМ "Милкоша" для выпойки ТЕЛЯТ



Рекомендуется, для получения конечного продукта использовать 1 кг порошка на 8-10 литров воды. Налить половину необходимого объема чистой воды с температурой не менее 70-80 °С. Всыпать порошок ЗЦМ из расчета 100 г на 1 литр готовой смеси, хорошо размешать. Добавить остальную часть воды и сразу же приступить к раздаче при температуре смеси около 38-40 °С.



ЗЦМ	1день (от рождения) по 7 день	2-я неделя	3-я неделя	4-я неделя	5-я неделя
Биолак 16%, протеин 21-22%, жир 16-17%	Молозиво: 1-1,5л х 3-4 раза в день	ЗЦМ: 1,5-2 л х 1 раз в день Коровье молоко: 1,5-2л х 2 раза в день	ЗЦМ: 2-3 л х 2 раз в день Коровье молоко: 2-3 л х 1 раз в день	ЗЦМ: 3-4 л х 2 раза в день	С 5-той по 10-ю недели ЗЦМ: 4-2 л х 2 раза в день, постепенно уменьшая количество ЗЦМ и переводя на воду и грубый корм (комбикорм)
Биолак 12% протеин 20-21%, жир 12-13%	Молозиво: 1-1,5л х 3-4 раза в день	Коровье молоко: 1,5-2л х 3 раза в день	Коровье молоко: 2-3л х 2 раза в день	ЗЦМ: 3-4 л х 1 раз в день Коровье молоко: 3-4 л х 1 раз в день	С 5-той по 10-ю недели ЗЦМ: 4-2 л х 2 раза в день, постепенно уменьшая количество ЗЦМ и переводя на воду и грубый корм (комбикорм)
Милкоша 16% протеин 21-22%, жир 15-16%	Молозиво: 1-1,5л х 3-4 раза в день	Коровье молоко: 1,5-2л х 3 раза в день	Коровье молоко: 2-3л х 2 раза в день	ЗЦМ: 3-4 л х 1 раз в день Коровье молоко: 3-4 л х 1 раз в день	С 5-той по 10-ю недели ЗЦМ: 4-2 л х 2 раза в день, постепенно уменьшая количество ЗЦМ и переводя на воду и грубый корм (комбикорм)
Милкоша 12% протеин 19-20%, жир 11-12%	Молозиво: 1-1,5л х 3-4 раза в день	Коровье молоко: 1,5-2л х 3 раза в день	Коровье молоко: 2-3л х 2 раза в день	Коровье молоко: 3-4л х 2 раза в день	ЗЦМ: 3-4 л х 1 раз в день Коровье молоко: 3-4 л х 1 раз в день. Далее, с 6-ой по 10-ю недели ЗЦМ: 4-2 л х 2 раза в день, постепенно уменьшая количество ЗЦМ и переводя на воду и грубый корм (комбикорм)

- С 4-7 дня по усмотрению, поить водой. С 10 дня возможна подкормка престартерными концентратами.
- Особое внимание уделяйте качеству используемой воды и чистоте посуды.
- Во избежании желудочно-кишечных расстройств не перекармливайте телят и не нарушайте условия и концентрацию разведения ЗЦМ.

Для поросят схема выпойки та же, с учетом уменьшения количества ЗЦМ в 10-15 раз и увеличения кратности кормления в 2 раза.