

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации Эл №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Гасанова С.М., Исупова В.Н. Статистика заболеваемости пиелонефритом // Академия педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный вестник. – 2016. – № 10 (ноябрь). – АРТ 83-эл. – 0,1 п.л. - URL: <http://akademnova.ru/page/875550>

РУБРИКА: МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616.61-002.3

С. М. Гасанова, В.Н. Исупова
студентки 4 курса, факультет педиатрический и лечебный
Научный руководитель: Стяжкина С.Н., д.м.н., профессор
ФГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская Академия»
г. Ижевск, Российская Федерация
e-mail: valyaisupova@mail.ru

СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Аннотация: В статье изложен анализ заболеваемости пиелонефритом в урологическом отделении БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» Удмуртская республика, г. Ижевска за 2016 год.

Ключевые слова: пиелонефрит, жалобы, госпитализация

S.M. Gasanova, V.N. Isupova
4nd year students, features of pediatric and therapy
Supervisor: Stiazhkina S.N., D.m.n., Professor
FGBOU VPO "Izhevsk state medical Academy"
Izhevsk, Russian Federation
e-mail: valyaisupova@mail.ru

THE INCIDENCE OF PYELONEPHRITIS

Abstract: The article describes the main types of sociological survey and features of its conduct. The article presents an analysis of the incidence of pyelonephritis in the urology department of HHCI UR "1 RKB MZ UR" Udmurt Republic, Izhevsk for the year 2016.

Keywords: pyelonephritis, complaints, hospitalization.

Согласно проведенным исследованиям пиелонефрит представляет собой неспецифический воспалительный процесс почечной паренхимы с преимущественным поражением межчашечной ее ткани и вовлечением в этот процесс лоханки, чашечек. Пиелонефриту может предшествовать небактериальный интерстициальный нефрит, который предрасполагает к проникновению бактерий в интерстициальную ткань с развитием в ней воспаления. Пиелонефрит занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваний почек. В последнее время отмечается значительное увеличение заболеваемости пиелонефритом, что связано с экологическими проблемами и с улучшением диагностики с использованием современных методов исследования.

В урологическом отделении 1 РКБ за 2016 год госпитализировано с пиелонефритом 53 пациента. 81,1% госпитализаций приходится на женщин и 18,8% - на мужчин. По течению заболевания структура следующая: острый пиелонефрит – 38 случаев (71,6%). Из них: острый гестационный пиелонефрит беременных – 9 случаев (16,9%); острый левосторонний пиелонефрит – 11 случаев (20,7%); острый правосторонний пиелонефрит – 18 случаев (33,9%); обострение хронического пиелонефрита – 15 случаев (28,3%). Только 5 больных из 53 (9,4%) госпитализированы планово.

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации Эл №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Остальные пациенты доставлены экстренно, при этом 14 пациентов (26,4%) доставлены в первые 6 часов, а 39 пациентов (73,6%) - позднее. Из них 22 пациента (56,4%) позднее 24 часов. Основными жалобами при поступлении являлись ноющие боли, в 25 из 53 случаев (47,1%) сопровождающиеся повышением температуры до 39,0о С, резь при мочеиспускании, в половине случаев – никтурия, а в случае обострения хронического заболевания – отечность лица. Острый пиелонефрит – заболевание преимущественно бактериальной этиологии, но в нашем исследовании только у 3 из 38 случаев (7,8%) высеялись микроорганизмы (*Enterococcus jejuni*, *Escherichia coli*). По данным ультразвукового обследования в большинстве случаев: 47 из 53 (88,6%) - наблюдаются пиелоэктазии. Изменения паренхимы незначительны или не выявляются: 18 случаев из 53 (33,9%). Вывод: Острое течение и обострения хронических пиелонефритов чаще возникает у женщин, в среднем, в возрасте $33,1 \pm 4,5$ лет. У обследованных мужчин средний возраст заболеваемости выше ($44,8 \pm 6,4$ лет), так как у женщин доля пиелонефритов приходится на острые гестационные пиелонефриты беременных в возрасте 21-35 лет. Выявлена связь между редкими случаями заболевания с бактериальной этиологией и незначительными изменениями паренхимы. Актуальность пиелонефрита как медико-социальной проблемы определяется большой распространенностью заболевания, известными трудностями клинико-лабораторной диагностики, хроническим прогрессирующим характером течения.

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации Эл №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Список использованной литературы:

1. Папаян А.В., Савинкова И.Д. Клиническая нефрология: руководство для врачей. – Санкт-Петербург: Медицина, 1997.
2. Стяжкина С.Н., Черненко М.Л., Гюльяхмедова Э.М., Габбасова Г.Р., Медведь М.С., Назаров В.В. Актуальные проблемы осложнений мочекаменной болезни // Успехи современного естествознания. – 2015. - №4.
3. Лопаткин Н.А. и Шабад А.Л. Урологические заболевания почек у женщин, с. 89, М 1985; 5. Лоран О.Б. Эпидемиологические аспекты инфекций мочевыводящих путей. Материалы симпозиума "Инфекции мочевыводящих путей у амбулаторных больных"; 16 февр 1999.
4. Стяжкина С.Н., Черненко М.Л., Волынин И.С, Мингалимова А.Р. Актуальные вопросы хронического пиелонефрита // Евразийский союз ученых (ЕСУ) – 2015 - №4(13).

Дата поступления в редакцию: 21.11.2016 г.

Опубликовано: 23.11.2016 г.

*© Академия педагогических идей «Новация». Серия «Студенческий научный вестник»,
электронный журнал, 2016*

© Гасанова С.М., Исупова В.Н., 2016