

Когда проводится вакцинация?

Вакцинация детей против кори, паротита, краснухи проводится в возрасте 12 месяцев, ревакцинация в 6 лет.

Дети от 1 года до 17 лет (включительно), женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках, подлежат иммунизации против краснухи.

Дети от 1 года до 17 лет и взрослые до 35 лет, не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках, а также взрослые от 36 до 55 лет, относящиеся к группам риска, подлежат иммунизации против кори.

Какие побочные эффекты могут быть после вакцинации?

- болезненность в месте инъекции
- кратковременная лихорадка
- слабо выраженная сыпь
- временная боль и скованность в суставах, в основном у подростков или взрослых женщин

Противопоказания к проведению вакцинации:

- аллергическая реакция (в т.ч. на аминокликозиды, белок перепелиного яйца)
- выраженная реакция или осложнения на предыдущую дозу
- первичные и вторичные иммунодефицитные состояния
- острые или обострение хронических заболеваний (вакцину можно вводить через 1 месяц после выздоровления или ремиссии)
- злокачественные заболевания крови
- беременность

Противопоказания к проведению вакцинации определяет только врач.

При легких формах ОРВИ и острых кишечных заболеваний прививки против кори, эпидемического паротита и краснухи проводят после нормализации температуры.

г.Москва,
1-й Смоленский пер.
д 9, стр.1 sgon@sgon.ru,
тел.8 (499) 2418628



Вакцинация против кори, эпидемического паротита, краснухи



ФУБЗ «Центр гигиенического образования населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека

Москва, 1-й Смоленский пер., д.9, стр.1

e-mail: sgon@sgon.ru;

тел.: 8(499)2418628



Корь, паротит, краснуха – высокозаразные вирусные заболевания, зачастую ведущие к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода. Основной путь передачи этих инфекций – воздушно-капельный.

Чем опасны корь, паротит, краснуха?

Корь - одна из основных причин смертности детей раннего возраста во всем мире.

Причиной большинства смертельных случаев становятся осложнения кори, которые чаще всего развиваются у детей до 5 лет и у взрослых старше 20 лет.

90% людей, без иммунной защиты против кори, находясь рядом с больным заразятся.

Симптомы: лихорадка, сыпь, кашель, насморк и конъюнктивит.

Осложнения – пневмония, отек головного мозга, слепота, отит.

Наиболее тяжело корь протекает у детей с иммунодефицитными состояниями и у ослабленных детей.

Эпидемический паротит - инфекция, при которой поражаются слюнные железы и центральная нервная система. Симптомы: лихорадка, головная и мышечные боли, усталость, снижение аппетита, припухлость слюнных желез.

Осложнения: отит, глухота, менингит, панкреатит, миокардит, воспаление лицевого нерва, бесплодие.

Заболевание эпидемическим паротитом в первые 3 месяца беременности приводит к выкидышу у каждой четвертой женщины.

Краснуха у детей протекает, как правило, легко, проявляется небольшим повышением температуры и недомоганием.

Взрослые и подростки болеют тяжелее.

Серьезную опасность представляет заболевание краснухой беременных: вирус вызывает развитие множественных уродств,

выкидыши, смерть плода.

Особенно опасно заболевание в первом триместре беременности. В этом случае риск поражения плода очень высок (до 75%).

При выявлении краснухи на сроке до 28 недель рекомендовано искусственное прерывание беременности.

Специфического лечения краснухи не существует.

Вы можете защититься от этих заболеваний, с помощью вакцинации.

Вакцинация детей против кори, паротита и краснухи проводится одновременно и предусмотрена Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Для иммунизации применяются медицинские иммунобиологические препараты, зарегистрированные и разрешенные к применению на территории Российской Федерации в установленном законодательством порядке согласно инструкциям по их применению.