

ЗАЩИТИТЕ СВОЕГО МАЛЫША ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА

Туберкулез - самое распространенное инфекционное заболевание, от которого погибает большое количество людей во всем мире. Заболевание передается от больного к здоровому человеку воздушно-капельным путем при кашле, чихании, разговоре.

После рождения ребенок соприкасается с возбудителями различных инфекций, в том числе и с возбудителем туберкулеза. Дети в возрасте до 1 года наиболее уязвимы для заражения туберкулезом.



ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ!

ВАКЦИНА БЦЖ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ МЕРОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА.

- Вакцинация проводится детям в родильном доме в 1- 4 сутки от момента рождения. Если по медицинским показаниям ребенка не привили в родильном доме вакциной БЦЖ, то он должен быть привит в детской поликлинике по месту жительства. Для сохранения защиты от туберкулеза, в 6 лет проводится повторная прививка (ревакцинация).
- На месте введения вакцины развиваются местные прививочные реакции (покраснение, припухлость, гнойничок, корочка), а к 1 году формируется вакцинальный рубчик, развитие которого протекает без болевых ощущений и ухудшения самочувствия ребенка.
- В редких случаях (около 0,02%) на введение вакцины БЦЖ наблюдаются побочные реакции (повышение температуры, ухудшение самочувствия и др). Дети с побочной реакцией наблюдаются врачом фтизиатром в течение года.



ПРИ ОТКАЗЕ ОТ ПРИВИВКИ БЦЖ ВАШ РЕБЕНОК МОЖЕТ:

- Заболеть тяжелой формой туберкулеза, способной привести к смерти
- Стать инвалидом после перенесенного туберкулезного менингита или других тяжелых форм заболевания.

РОДИТЕЛИ!

Вы ответственны за здоровье и жизнь своего ребенка.

Своевременно проведенные вакцинация и ревакцинация позволят защитить ребёнка от туберкулезной инфекции.

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ СВОЕГО РЕБЕНКА С РОЖДЕНИЯ!