

ВЕШЕНКА СТЕПНАЯ

Вешенка степная или королевская - самый вкусный гриб среди вешенок, о чем и говорит ее название. Имеет мощную ножку, не уступающую по кулинарным качествам шляпкам. По вкусу напоминает белый гриб. По внешнему виду напоминает обычный лесной одиночный гриб. Шляпка выпуклая, затем образуется воронка.

Природное местообитание степной вешенки - степи и лесостепи, она селится не на деревьях, а на травах семейства зонтичных. В Северо-Западном регионе возможное поселение на корешках моркови, сельдерея, пастернака, петрушки, борщевика и др.

Плодовые тела в природных условиях развиваются прямо из земли. Субстратом для грибницы служат отмершие растительные остатки.

Посадку вешенки степной осуществляют с конца апреля до августа месяца, когда земля прогреется. Высаживают вешенку 3-мя способами.

1. ***Соответствует способам выращивания вешенки обыкновенной или устричной.*** В отличие от вешенки обыкновенной королевская зарастает дольше в 2-3 раза, поэтому субстрат для нее необходимо **стерилизовать**.
2. ***Комбинированный.*** При нерегулируемых условиях микроклимата (например в естественных условиях) лучше использовать вариант с покровной почвой. Для этого мешок с уже зараженным в течение 6-8 недель субстратным блоком перевернуть «кверху ногами», раскрыть, сделать бортик из пакета высотой 5-7 см, на поверхность блока насыпать покровный слой, толщиной 0,5-1 см. Это надо для стимулирования роста грибов и, чтобы уменьшить скорость высыхания субстрата. Сверху необходимо поддерживать субстрат во влажном состоянии, используя мелкокапельное опрыскивание. Плодоношение при этом происходит сплошным слоем по открытой поверхности. В качестве покровной почвы можно использовать землю или нейтрализованный мелом торф.
3. ***Посадка в лесную или неразрыхленную огородную почву.*** Перед посадкой мицелий вешенки размять до отдельных зерен или до комочков, величиной с грецкий орех, и высадить под лесную подстилку или почву под 2-3х сантиметровой слой. Почву сбрызнуть водой и поддерживать во влажном состоянии до появления грибов. Для поддержания микроклимата и сохранения влажности место посадки желательно закрыть прошлогодней листвой, соломой, сеном, перфорированной полиэтиленовой пленкой, и др. Через 3-4 недели «покрышку» можно снять. Плодоношение в пасмурную погоду может длиться все лето и осень, при засушливом лете плодоношение начнется в сентябре – октябре, при наступлении оптимальных условий для плодоношения – температура воздуха 15-18град.С, влажность 80-100%.