

Инструкция по применению косметического средства Remover A.Shakhova:

Remover A.Shakhova – это косметическое кремообразное средство белого цвета для осветления (удаления) и коррекции пигмента в коже.

Используется при удалении перманентного макияжа, микроблейдинга (брови, губы, глаза - контурная стрелка и теневые растушевки века), а так же для татуировки. Удаляет пигменты любого цвета и насыщенности путем извлечения красителя из кожи.

Remover A.Shakhova предназначен только для профессионального использования практикующими мастерами аппаратного и ручного метода перманентного макияжа и татуировки. Для более рационального и эффективного использования Remover A.Shakhova рекомендуется пройти обучающий курс, для достижения прогнозируемых и желаемых результатов. Попадание ремувера в слизистую глаза не допустимо!

При работе с ремувером в области век, примите максимальные меры предосторожности, используя барьерные капли и средства для защиты слизистой глаза!

Чтобы подготовить кожу к процедуре осветления (выведения) пигмента рекомендуется:

Обработать кожу без спиртовым антисептиком.

Нанести предварительную (аппликационную) анестезию с содержанием анестезирующих веществ более 5%.

Рекомендуемая экспозиция 15-20 минут.

Удалить остатки анестетика.

Излишнее уплотнение кожи не способствует эффективному использованию Remover A.Shakhova

- Если не применяете анестезию, рекомендуется увлажнить и смягчить поверхность кожи специализированными гелями и кремами, для более комфортного проведения процедуры.

Перед использованием необходимо встряхнуть (смешать) тубу в течении 2-3 мин, для получения однородной «кремовой» консистенции.

Открыть крышку и выдавить необходимый объем из тубы Remover A.Shakhova в одноразовую стерильную емкость (колпачок для пигментов).

- Плотнo закройте крышкой во избежание высыхания крема.

- При необходимости, для получения более жидкой консистенции, Remover A.Shakhova можно разбавлять разбавителем AS MAGIC WATER

Для внесения Remover A.Shakhova в кожу необходимо использовать роторные аппараты для перманентного макияжа или татуировки. Процедура аналогична нанесению перманентного макияжа и татуировки с применением всех техник (точечной, линейной, штриховой, спиральной).

Используйте одноразовые стерильные иглы и наконечники, либо игольные модульные системы (картриджи).

Рекомендуется использовать конфигурации игл типа Round Shader (3 RS, 5 RS), либо другие адаптивные конфигурации для работы определенного типа.

Погрузите иглу в емкость с Remover A.Shakhova, при включенном аппарате, чтобы набрать крем. Повторяйте каждый раз для пополнения, во избежание работы «пустой иглой».

Введите средство в верхние слои кожи, используя атравматичные техники. Remover A.Shakhova должен быть внесен только в места залегания пигмента для дальнейшего взаимодействия. На удаляемом участке выполните не более 2-3-х проходов внесения Remover A.Shakhova, во избежание излишней травматизации кожи.

С поверхности кожных покровов ремувер лимфу, сукровицу нужно вытирать НАСУХО!

По окончании аппаратного внесения, дождитесь остановки лимфооттока. Используйте сухие впитывающие салфетки в качестве компресса.

Нанесите тонкий слой ремувера на всю выводимую поверхность, подождите 3-5 мин до полного высыхания.

Удалите остатки ремувера.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ, МЫЛА, ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА И ХЛОРГЕКСИДИНА

Возможно легкое жжение и покалывания на обрабатываемом участке кожи.

Повторные процедуры не рекомендуется проводить ранее чем через 45 дней.

УХОД ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ:

Уход Сухой!

Ежедневно после процедуры рекомендуем в течении 7-10 дней наносить 2-3 раза в день тонкий слой специального впитывающего крема, в составе которого будет присутствовать такой компонент как ДЕКСаПАНТЕНОЛ для сохранения эластичности кожи и комфортного естественного процесса заживления.

Образовавшиеся «корочки» нельзя сдирать до момента естественного отхождения.

Нельзя посещать сауны, солярии (не загорать), бассейны и открытые водоемы, принимать горячие ванны (не распаривать!), в течении всего процесса заживления! Первые 3 дня следует избегать прямые контакты с водой.

После отхождения корочки рекомендуется применять специализированные крема (контрактубекс) для профилактики образования рубцов и шрамов (использовать в течении месяца).

Повторные процедуры рекомендуем проводить не ранее, чем через 45 дней после проведения первой, учитывая все индивидуальные особенности.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Плохое самочувствие любого происхождения, ОРВИ, даже «просто насморк» без температуры, то процедуру лучше отложить до полного выздоровления.

Воспалительные процессы на коже, гнойничковые высыпания в зоне воздействия, обострение угревой болезни и розацеа также являются противопоказанием. Процедуру можно делать только во время ремиссии – отсутствия воспалительных элементов и гнойничков на коже.

Лечение сильнодействующими лекарствами: антибиотиками, кортикостероидами, антикоагулянтами, ретиноидами и др. Во время курса лучевой и химиотерапии. Проведение процедуры возможно не ранее двух недель (или более, в зависимости от конкретного препарата) после окончания лечения. Злокачественные опухоли. Процедуру можно делать только с письменного разрешения лечащего врача. Доброкачественные новообразования кожи в зоне воздействия. Противопоказано проведение процедуры в зоне родинок, бородавок. Аллергические болезни (например, атопический дерматит) и реакции (например, рецидивирующий аллергический дерматит). Период беременности и кормления грудью. Пластические операции в области предполагаемого места удаления перманентного макияжа или тату. Например, после блефаропластики удаление перманентного макияжа век можно делать не ранее, чем через 6 месяцев после операции, после полной стабилизации тканей. Период менструации сопровождается повышенной болевой чувствительностью и сниженной свертываемостью крови, поэтому процедуру лучше планировать на середину цикла.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- декомпенсированные формы сахарного диабета;
- тяжёлые заболевания внутренних органов, печеночная и почечная недостаточность;
- любые хронические болезни в период обострения;
- повышенная температура тела;
- склонность кожи к образованию келоидных рубцов;
- прогрессирующая стадия псориаза, псориатические высыпания на лице;

- тяжелые иммунодефицитные состояния, ВИЧ;
- гемофилия и другие заболевания, сопровождающиеся снижением свертываемости крови;
- эпилепсия, повышенная судорожная готовность;
- тяжелые психические расстройства;
- алкогольное и наркотическое опьянение.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте, при температуре не выше +23 С.

СРОК ГОДНОСТИ:

2 года со дня изготовления (дату изготовления смотреть на упаковке)

Не использовать после истечения срока годности.

После вскрытия тубы рекомендуется использовать ремувер в течении 30 дней, при соблюдении условий хранения и повторном использовании крышки.

СОСТАВ:

Water, Calcium oxide, Glycerin, Zinc oxide, Magnesium oxide, Triethanolamine, n-propanol, Benzoic acid.