

Пациент: Ноздрин Алексей
Возраст: 26 лет

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ИЗЛОЖЕНЫ ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКИХ
ОБСЛЕДОВАНИЙ И ВЫВОДЫ ВРАЧЕЙ

Результаты ПЭТ КТ от 29.05.2016

Клинические данные: саркома. Состояние после радиотерапии. Исследование проводится в ходе лечения препаратом Вотриент. Также получал бисфосфонаты. Сравнение с результатами ПЭТ КТ от апреля 2016 г.

Следует отметить нарушенную дистрибуцию ФДГ, возможно, по причине несоблюдения подготовки к исследованию (натошак) или (что менее вероятно) на фоне лечения препаратом Вотриент.

По-прежнему визуализируются опухолевые образования в области ворот легкого и парамедиастинальной области справа, без значительных изменений в размерах. Более каудальный фрагмент вблизи ворот легкого был 2.8*3.9 см, в настоящее время 3.1*3.4 см; размер более краниального образования был 2.4*5 см, в настоящее время 2.7*5.7 см.

На прошлых исследованиях, при нормальной дистрибуции ФДГ, наблюдалась повышенная абсорбция по периметру образований, некоторые ее признаки отмечаются и на этот раз.

Утолщение плевры и количество закапсулированной жидкости в грудной клетке справа без изменений.

На КТ – обширное метастатическое распространение в скелете.

На предыдущем исследовании возможно было различить очаги активного заболевания и контролируемые метастазы; в настоящее время нет очаговой абсорбции в скелете, однако метастатическое распространение осталось без существенных морфологических изменений, включая позвонок D11, пораженный в области межпозвоночного отверстия.

Заключение:

Часть ПЭТ не информативна, возможно, пациент явился на исследование не натошак (или ввиду того факта, что исследование проводится на фоне биологического лечения, что менее вероятно).

На КТ нет значительных изменений в злокачественных образованиях в грудной клетке, поражении плевры справа и метастатическом костном распространении.

Проф. Э. Эвен-Сапир, д-р Ю. Вайнштейн.

Консультация онколога, профессора Меримского, от 01.06.2016

Пациент чувствует себя лучше, чем 2 месяца. Получает Вотриент. Были боли в стенке грудной клетки и в ключице – в настоящее время по-прежнему периодически ощущает боль. Боль усиливается в положении лежа на левом боку.

Боль в левом тазобедренном суставе, отмечавшаяся 2 месяца назад, на данный момент уменьшилась.

УЗИ сердца – опухоль уменьшилась с 3 до 2.5 см.

5 недель назад присутствовал тромб. В настоящее время тромб уменьшился на 50% на фоне приема кроверазжижающих препаратов. Получает антигипертензивное лечение.

ПЭТ КТ от 29.05.2016 по сравнению с 04/2016 – заболевание стабильное.

Пациент интересовался возможностью радиотерапии. Разъяснено, что ввиду наличия множественных очагов заболевания необходимо системное лечение.

Рекомендовано продолжать прием Вотриент + Зомера.

Повторный визит через 2 месяца с результатами ПЭТ КТ.

С уважением,
TOP Experts Center