

Меланотан 2 спрей: инструкция по применению

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Меланотан 2 используют в случаях, когда нарушена функция выработки меланина, а также для появления загара и защиты от ультрафиолетовых лучей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ


- Лицам не достигших совершеннолетия;
- Беременным и кормящим, и женщинам в период лактации;
- Людям, имеющих какие-либо виды опухолей;
- Людям, с признаками меланомы и гиперпигментации;
- Запрещено использование совместно с сильнодействующими антибиотиками.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Меланотан 2 спрей принимается назально с помощью дозатора ежедневно.



1. Возьмите в руки флакон и слегка встряхните его не менее 4-х раз в вертикальном положении;



2. Снимите защитный колпачок;



3. Проверьте пульверизатор, для этого нажмите на аппликатор для получения струи. Если потребуется, то несколько раз.



4. Слегка наклоните голову вперед. Вставьте аппликатор в ноздрю и сделайте необходимое количество впрысков, согласно выбранной дозировке (см. пункт дозировка). Повторите ту же процедуру для второй ноздри.

На протяжении приема меланотана необходимо ходить в солярий или загорать на Солнце. Первое посещение солярия следует осуществить на третий день приема меланотана. Походы в солярий следует осуществлять с минимальным промежутком в 3–4 дня. Курс приема меланотана составляет примерно 11–14 дней в зависимости от необходимо оттенка загара, но не более 30 дней. При достижении желаемого загара, спрей можно использовать 1 раз в неделю для поддержания загара.

ДОЗИРОВКА

Рекомендуемая дозировка выбирается исходя из массы тела согласно табл.1.

Таблица 1

Оптимальная дозировка

Вес, кг.	Количество впрыскиваний в ноздрю в сутки, кол-во.	Общее количество впрыскиваний в сутки, кол-во.
50-60	3	6
70-80	4	8
90-100	5	10

Для лучшего усваивания препарата рекомендуется разбить его прием на два раза в день (утром и вечером). Так же при первом приеме Мелантона 2 спрей можно ввести дозировку ниже рекомендуемой, чтобы проверить отклик вашего организма на прием препарата. Серьезно отнеситесь к выбору дозировки и также на протяжении всего курса следите за состоянием кожи.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- **Кратковременное повышение давления** — обычно проявляется в первые 1–3 приема, это вызвано защитной реакцией организма на резкое повышение нормы меланина, со временем организм привыкает и перестает так реагировать на меланотан. Поэтому людям с повышенным давлением следует с осторожностью отнестись к применению.
- **Появление пигментных пятен «веснушек»** — поскольку меланотан повышает выработку меланина, что влечет за собой потемнение кожного покрова под воздействием ультрафиолетовых лучей. Темнеет вся кожа, в том числе скрытые пигментные пятна на теле человека. Также веснушки могут появиться в местах повышенного скопления меланина. Процесс этот обратимый, обычно они проходят за 4–8 недель.
- **Покраснение лица** — вызвано это повышением давления в первые 1–3 дня приема и длится обычно не более 30 минут.
- **Повышение либидо** — данный пункт будет интересен в основном мужчинам, выражается в виде активной эрекции.
- **Тошнота и неприятные ощущения в животе** — проявляется в период привыкания организма (в первые 1-3 дня приема), также меланотан оказывает нагрузку на печень и пищеварительный тракт.
- **Потеря аппетита** — при применении меланотана может снижаться аппетит.
- **Снижение жировой прослойки** — меланотан оказывает влияние на расщепление жирных кислот в организме при наличии физических нагрузок и соблюдении режима питания.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Меланотан 2 спрей следует хранить в холодильнике при температуре 2–8 °С.

Срок годности до первого использования составляет 1 год с даты изготовления (см. на упаковке).

Срок годности после первого использования составляет 2 месяца.

Перемещение спрея без холодильной камеры возможно в течение не более 2-х суток.

При нарушении условий хранения свойства меланотана 2 спрея теряются.