

ЕСТЬ ВАКЦИНА! ГЕПАТИТ В



Гепатит В в

50-100

раз заразнее, чем
ВИЧ



Осложнения:
переход в
хронический
гепатит
цирроз печени
рак печени



У взрослых
с хроническим
гепатитом В рак
и/или цирроз
развивается в

20-30%

случаев

Симптомы:
желтушность кожи
и склер глаз,
усталость, “ломота”
мышц и суставов,
тошнота, боли в
животе, часто -
бессимптомное
течение



Риск развития
хронического
гепатита при
инфицировании
детей младше года -
до

95%

Вакцинация,
начатая в раннем
возрасте -
самая эффективная
мера
профилактики
гепатита В



ЕСТЬ ВАКЦИНА! ГЕПАТИТ А

Гепатит А (болезнь Боткина) - острая вирусная инфекция, смертность

0,5%

среди вирусных гепатитов

Гепатит А имеет фекально-оральный механизм передачи; передается через грязные руки, воду, овощи и фрукты, посуду, предметы обихода



3-20%

больных имеют несколько рецидивов заболевания

Симптомы: общее недомогание, повышенная утомляемость, анорексия, тошнота, рвота, желтуха



Человек становится заразным за

2

недели до появления желтухи

Вакцинация - самая эффективная мера профилактики гепатита А



Прививки детям

Вирусный гепатит В

Схема вакцинации

V1 в течение 24 часов после рождения

V2 через месяц

V3 еще через 5 месяцев

Группы риска

V1 в течение 24 часов после рождения

V2 через месяц

V3 еще через месяц

V4 через 1 год после начала вакцинации



У 95 % инфицированных новорожденных развивается хроническая форма гепатита В, которая может спровоцировать развитие цирроза и рака печени

СКАЗОЧНЫЕ ПРИВИВКИ ГЕПАТИТ В



*Гепатит, как привидение,
Незаметно поразит!
От болезни есть спасенье —
Каждый должен быть привит.*

СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ

V1 - в первые 24 часа жизни

V2 - в 1 месяц

V3 - в 6 месяцев

egon.rospotrebnadzor.ru